Les affections potentiellement malignes de la muqueuse buccale

Potentially malignant disorders of the oral mucosa

Pr Aidoud.S .Service de pathologie et chirurgie Buccales

Cours_5éme_Année

Erythroplasie

L'érythroplasie de la muqueuse est toujours considérée comme la lésion au potentiel de transformation maligne le plus élevé.

Il s'agit d'une plage veloutée, rouge brillant le plus souvent uniforme sans trace de kératinisation, ayant des limites nettes (OMS 1978),ce qui la distingue des érythèmes inflammatoires.



Lichen Plan Buccal

Le lichen plan est une maladie inflammatoire chronique d'origine immunitaire à médiation cellulaire.
Son étiologie est inconnue.
Il se caractérise par un trouble de la kératinisation

Les lymphocytes T s'y accumulent en dessous de l'épithélium et augmentent le rythme de différenciation épithéliale. Il en résulte une hyperkératose et de l'érythème avec ou sans érosion

Lichen plan érosif

- le lichen se caractérise par des formes cliniques variées dont le lichen plan buccal érosif qui correspond à 40 % des lésions.
- Cette forme particulière se distingue par une symptomatologie et des signes cliniques et histologiques particuliers. Généralement hyperalgique, ce type de lésions nécessite un traitement à base de corticoïdes locaux ou de rétinoïdes topiques.

Lichen plan de la joue
Stade initial

L.P.en réseau

Lichen plan érosif

Lichen plan érosif

Lichen plan érosif

L.P.hyperkératosique

Cheilite actinique

Les chéilites actiniques s'observent surtout chez les hommes de plus de 45 ans que leur profession expose pendant plusieurs années au soleil.

L'aspect clinique initial est celui d'une desquamation réactionnelle qui se transforme en chéilite hyperkératosique desquamative et fissuraire.

ésions palatines des fumeurs inversé

lésions palatines des fumeurs inversés

Cette affection est spécifique des populations qui fument avec l'extrémité incandescente de la cigarette dans la bouche.
Les lésions sont palatines, rouges, blanches ou mixtes



La fibrose sous muqueuse

La fibrose sous muqueuse est une maladie chronique invalidante de la cavité buccale caractérisée par l'inflammation et la fibrose progressive des tissus sous muqueux.
Elle est observée surtout en inde, mais aussi dans d'autres régions d'Asie.

Lupus érythémateux Dicoide

- Il s'agit affection chronique auto-immune dans laquelle le système immunitaire de la peau est anormalement ciblé, entraînant une inflammation et une éruption cutanée.

Le mot « discoïdes » renvoie à la forme de disque des lésions qui composent l'éruption cutanée

Maladie Héréditaires:
dyskératose congénitale

La dyskératose congénitale et l'epidermolyse bulleuse peuvent entrainer un risque accru dans la cavité buccale.

Il s'agit de maladies héréditaires très rares
Dans la dyskératose congénitale lié au chromosome X et ne touchant que les males ,

des plaques blanches des plaques blanches de la face dorsale de la langue peuvent être présentes

Maladie Héréditaires:
Epidermolyse bulleuse



L'épidermolyse bulleuse est une maladie génétique héréditaire de transmission autosomique dominante.

Elle se caractérise par des atteintes cutanées : formation de bulles au niveau des différentes couches de l'épiderme.

Conclusion

le médecin dentiste joue un rôle important dans la prévention et le dépistage precoce des lésions potentiellement malignes